

Familiaire hyperlipidemie: danazol

3049

Bron	Bewijs	Effect
Am J Obstet Gynecol 1983;145:422-6	studie n=33	25 patiënten met endometriose en 8 gezonde vrouwen kregen gedurende 2-6 maanden danazol 200-800 mg/dag. Bij 1 vrouw met familiale dys- β -lipoproteïnemie en 2 vrouwen met familiale hypertriglyceridemie trad een daling van plasmalipiden en lipoproteïnen naar normaalwaarden op. Bij alle vrouwen trad een geringe daling van het totaal cholesterol op (40% daling van HDL, geen significant effect op LDL en VLDL) en een daling van triglyceriden met 40%. Binnen 4 weken na staken van danazol werden de oorspronkelijke lipidewaarden weer bereikt.
Acta Obstet Gynecol Scand Suppl 1994;159:35-40	review	LDL-toename 10-40% en HDL-afname ongeveer 50%. Effecten waren dosisonafhankelijk. De LDL- en HDL-spiegels waren binnen 8 weken na staken van de therapie weer normaal. Triglyceridenspiegels werden niet beïnvloed. De auteurs geven aan dat in vroege studies weinig effect van danazol op cholesterol en triglyceriden werd gevonden, maar dat later subtiele veranderingen in plasmalipiden en lipoproteïne-metabolisme werden gemeld.
Drug Saf 2001;24:443-56	review	De belangrijkste indicatie is endometriose. Verwezen wordt naar bovenstaand artikel.
IB - tekst. Danazol: Danatrol 16-02-2004.		<u>Bijwerkingen</u> : tijdelijke toename LDL- en afname HDL-spiegels en afname in apolipoproteïne A I en A II is bij vrouwen te verwachten.

Opmerkingen:

- Er is onvoldoende onderbouwing voor een contra-indicatie.

Datum literatuursearch: 19-04-2010.

co-morbiditeit	Diabetes mellitus, HVZ, obesitas, hypertensie, nier- en leverfunctiestoornissen.
Incidentie	

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	nee	nee	10-01-2011