

Myasthenie: magnesiumzouten (excl. magnesiumsulfaat) 3063

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 SPC Ionolyte (infusieoplossing met magnesiumchloride) 30- 10-09.		<u>Waarschuwing:</u> Oplossingen die magnesiumzouten bevatten, moeten met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met myasthenia gravis. Patiënten moeten worden opgevolgd voor klinische verschijnselen van een teveel aan magnesium, met name wanneer ze voor eclampsie worden behandeld.

Opmerkingen:

- Geen literatuur gevonden (PubMed).
- De SPC's Rennie (calciumcarbonaat/magnesiumcarbonaat) 02-07-08, Antagel PCH (aluminiumoxide/magnesiumoxide) 31-03-03, Substitutieoplossing voor Hemofiltratie BH 496 01-11-08 (oplossing met magnesiumchloride) en Nutriflex special 70/240 (intraveneuze voeding met magnesiumacetaat) bevatten geen informatie.
- Projectgroep: er is geen onderbouwing voor een contra-indicatie. Bij patiënten met een normale nierfunctie wordt magnesium snel via de nieren uitgescheiden. Bij patiënten met een slechte nierfunctie is magnesium gecontraïndiceerd. Bij behandeling van pre-eclampsie kunnen door de snelle intraveneuze toediening van grote hoeveelheden magnesium wel problemen optreden, maar hiervoor is alleen magnesiumsulfaat geïndiceerd.

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	nee	nee	10 januari 2011