

Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding: silodosine

3175 t/m 3178

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 SPC Silodyx (rev.7) 31-01-2013.	<i>kinderwens (vrouw)/zwangerschap/borstvoeding</i> Niet van toepassing, omdat Silodyx uitsluitend voor mannelijke patiënten bedoeld is. <i>kinderwens (man)</i> De meest voorkomende bijwerkingen van silodosine die in placebogecontroleerde klinische onderzoeken en tijdens gebruik op de lange termijn werden gemeld, waren ejaculatiestoornissen zoals retrograde ejaculatie en anejaculatie (verminderd of geen ejaculatievolume), met een frequentie van 23%. Dit kan tijdelijk de vruchtbaarheid bij de man beïnvloeden. Deze bijwerking is na staken van de behandeling binnen een paar dagen reversibel (zie rubriek 4.4). Verminderd libido en erectiestoornissen zijn gemeld (frequentie <1%)	<i>kinderwens (man)</i> Vóór het starten van de behandeling moet de patiënt worden geïnformeerd dat het optreden van een ejaculatie met verminderde of afwezige zaadlozing kan optreden, en dat het tijdelijk de mannelijke vruchtbaarheid kan beïnvloeden.

Opmerkingen:

-

	Effect	Actie	Datum
Beslissing KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum			30 juli 2013
Kinderwens (vrouw)*	onbekend	ja	
Zwangerschap	onbekend	ja	
Borstvoeding	onbekend	ja	
Kinderwens (man)**	ja	ja	

* Kinderwens, gebruik van het middel door de vrouw

**Kinderwens, gebruik van het middel door de man