

Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding: mupirocine

3730 t/m 3733

TGA = Therapeutic Goods Administration; TIS = Teratologie Informatie Service

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 Schaefer C et al. Drugs during pregnancy and lactation. Treatment options and risk assessment. Londen: Academic Press; 2007. p. 443	<i>zwangerschap</i> Er zijn geen data over het lokaal gebruikte antibioticum mupirocine.	
ref. 2 Commentaren Medicatiebewaking 2011/2012. Houten: Health Base; 2011. p. 840, 844, 907 (informatie TIS).	<i>zwangerschap</i> Er is onvoldoende ervaring met het gebruik van mupirocine (lokaal, nasaal) tijdens de zwangerschap. Bij toepassing van dermatica op grotere huidoppervlakken, (brand)wonden en ontstoken huid moet met een behoorlijke systemische resorptie rekening gehouden worden. De resorptie van mupirocine bij nasale toediening is te verwaarlozen, waardoor nadelige effecten bij het ongeboren kind onwaarschijnlijk zijn. <i>borstvoeding</i> Mupirocine wordt nauwelijks geabsorbeerd, maar er is geen ervaring met gebruik tijdens de lactatie.	<i>borstvoeding</i> Gebruik van mupirocine en/of borstvoeding afwegen.
ref. 3 TGA. Prescribing medicines in pregnancy database. http://www.tga.gov.au/hp/medicines-pregnancy.htm . Geraadpleegd 28-07-2011.		Categorie B1: Geneesmiddel dat slechts door een beperkt aantal zwangere en vruchtbare vrouwen is gebruikt zonder dat een verhoogde incidentie van misvormingen of andere direct of indirect schadelijke effecten op de foetus zijn waargenomen. Onderzoek bij dieren heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor een verhoogde incidentie van foetale schade.
ref. 4 SPC Bactroban zalf 12-04-2011 e.a.*	<i>zwangerschap</i> Er is geen klinische ervaring met het gebruik van mupirocine tijdens zwangerschap. In dierstudies zijn tot dusver geen aanwijzingen voor schadelijkheid gevonden. <i>borstvoeding</i> Er is geen informatie over de uitscheiding van mupirocine in de moedermelk.	<i>zwangerschap</i> Weeg de voordelen van het gebruik van Bactroban tijdens de zwangerschap af tegen de mogelijke risico's voor de foetus. <i>Borstvoeding</i> Voorzichtigheid is geboden bij gebruik van Bactroban tijdens het geven van borstvoeding. Bij behandeling van tepelkloven met mupirocine de behandelde borst

Bron	Effect	Opmerkingen
		afkolven en de melk weggooien.

* Bactroban neuszalf 12-04-2011.

Opmerkingen:

-

	Effect	Actie	Datum
Beslissing KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum			23-03-2012
Kinderwens (vrouw)*	onbekend	ja	
Zwangerschap	onbekend	ja	
Borstvoeding	onbekend	ja	
Kinderwens (man)**	onbekend	nee	

* Kinderwens, gebruik van het middel door de vrouw

**Kinderwens, gebruik van het middel door de man