

Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding: fludrocortison lokaal

3793 t/m 3796

TGA = Therapeutic Goods Administration; TIS = Teratologie Informatie Service

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 Schaefer C et al. Drugs during pregnancy and lactation. Treatment options and risk assessment. Londen: Academic Press; 2007. p. 66-7, 392-7, 447, 461, 752-3, 766-7.	<i>zwangerschap</i> Alle systemische glucocorticosteroïden passeren de placenta in meer of mindere mate, waarbij de blootstelling van de foetus kan variëren per middel. Er is geen bewijs voor een verhoogd teratogeen risico bij gebruik van corticosteroïden tijdens het eerste trimester. <i>borstvoeding</i> Er zijn onvoldoende data beschikbaar over de overgang van fludrocortison in de moedermelk. Oordruppels werken lokaal in de gehoorgang en vormen geen probleem, aangezien ze niet geabsorbeerd worden.	<i>zwangerschap</i> Oordruppels met een corticosteroïd kunnen voor de juiste indicaties gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Bij twijfel kunnen de aanbevelingen bij de systemische toepassing van de stof worden gevolgd. <i>borstvoeding</i> Corticosteroïden toegediend in oordruppels zijn verenigbaar met borstvoeding.
ref. 2 Commentaren Medicatiebewaking 2011/2012. Houten: Health Base; 2011. p. 835, 911, 921 (informatie TIS).	<i>zwangerschap</i> Voor de meeste middelen bij ooraandoeningen is een specifiek advies voor gebruik tijdens de zwangerschap niet nodig, omdat de systemische belasting te laag wordt geacht om effect op de foetus te hebben. Chronisch gebruik van hoge doseringen corticosteroïden kan leiden tot intra-uteriene groeivertraging. Chronisch gebruik tijdens het derde trimester kan theoretisch neonatale bijnierschorsuppressie veroorzaken. <i>borstvoeding</i> In principe kunnen oordruppels worden gebruikt tijdens de borstvoeding, aangezien het om minimale hoeveelheden gaat en de absorptie gering is.	<i>zwangerschap</i> Fludrocortison (oordruppels) kan worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
ref. 3 TGA. Prescribing medicines in pregnancy database. http://www.tga.gov.au/hp/medicines-pregnancy.htm . Geraadpleegd 10-08-2011.	Systemisch, cutaan.	Categorie A: Geneesmiddel dat door een groot aantal zwangere en vruchtbare vrouwen is gebruikt zonder dat een verhoogde incidentie van misvormingen of andere direct of indirect schadelijke effecten op de foetus zijn aangetoond.
ref. 4 SPC Panotile oordr 18-01-2007	<i>zwangerschap</i> De lokale toepassing van corticosteroïden in grote hoeveelheden of gedurende langere tijd in de zwangerschap wordt in het algemeen ontraden.	<i>zwangerschap</i> Panotile kan, voor zover bekend, zonder gevaar overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap.

Bron	Effect	Opmerkingen
	<i>borstvoeding</i> Er zijn geen gegevens bekend over het voorkomen van fludrocortison of zijn metabolieten in moedermelk na toediening in het oor.	

Opmerkingen:

-

	Effect	Actie	Datum
Beslissing KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum			21 mei 2012
Kinderwens (vrouw)*	nee	ja	
Zwangerschap	nee	ja	
Borstvoeding	nee	ja	
Kinderwens (man)**	onbekend	nee	

* Kinderwens, gebruik van het middel door de vrouw

**Kinderwens, gebruik van het middel door de man