

Porfyrie: chlooramfenicol

3967

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Website van het European Porphyria Initiative. www.porphyria-europe.com	review	Chlooramfenicol staat op de lijst met onveilige middelen.
ref. 2 Website van het Noorse porfyriecentrum NAPOS. www.drugs-porphyria.com	review	Chlooramfenicol is bij oculair gebruik waarschijnlijk niet porfyrinogeen. Dit betekent dat het een eerstekeuzemiddel bij porfyriepatiënten is. Er zijn geen voorzorgsmaatregelen nodig. Chlooramfenicol voor auriculair gebruik is nog niet geclassificeerd.

Opmerkingen:

- Chlooramfenicol wordt alleen nog oculair en auriculair toegepast. Volgens het Informatorium Medicamentorum wordt chlooramfenicol in geringe mate geabsorbeerd via het oog en de SPC meldt dat systemische bijwerkingen (bloeddyscrasieën) ook na oculaire toediening zijn voorgekomen. De FNA-bijsluiter van de dexamethason/chlooramfenicol/polymyxine-B-oordruppels vermeldt een acute aanval van porfyrie als mogelijke systemische bijwerking. Om deze reden zijn alle toedieningsvormen van chlooramfenicol in de bewaking opgenomen.

Risicofactoren	alcohol, dehydratie, endogene steroïden, energiearme diëten, infectie, koorts
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	ja	ja	22-05-2012