

Porfyrie: benzodiazepines

3976

Chloordiazepoxide, clorazepinezuur, diazepam, flunitrazepam, flurazepam, nitrazepam, oxazepam, prazepam.

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Website van het European Porphyria Initiative. www.porphyria-europe.com	review	Chloordiazepoxide, clorazepinezuur, flunitrazepam, flurazepam, nitrazepam, oxazepam en prazepam staan noch op de lijst met onveilige middelen noch op de lijst met veilige middelen.
ref. 2 Website van het Noorse porfyriecentrum NAPOS. www.drugs-porphyria.com	review	Diazepam is niet porfyriogeen en oxazepam is waarschijnlijk niet porfyriogeen. Dit betekent dat het een eerstekeuzemiddel bij porfyriepatiënten is. Er zijn geen voorzorgsmaatregelen nodig. Flunitrazepam en nitrazepam zijn waarschijnlijk porfyriogeen. Alleen gebruiken als dit echt nodig is. Voorzorgsmaatregelen worden geadviseerd bij alle patiënten. Chloordiazepoxide, clorazepinezuur, flurazepam en prazepam zijn nog niet geclassificeerd.

Opmerkingen:

- Datum raadpleging websites: 28-07-2016.

Risicofactoren	alcohol, dehydratie, endogene steroïden, energiearme diëten, infectie, koorts
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	ja	ja	22-05-2012