

# Porfyrie: lidocaïne (als anti-arrhythmicum)

3983

| Bron                                                                                                         | Bewijs | Effect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ref. 1</b><br>Website van het European Porphyria Initiative.<br>www.porphyria-europe.com.                 | review | Lidocaïne staat op de lijst met veilige middelen met de toevoeging dat intraveneuze toediening moet worden vermeden.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ref. 2</b><br>Website van het Noorse porfyriecentrum NAPOS.<br>www.drugs-porphyria.com                    | review | Lidocaïne is waarschijnlijk niet porfyriogeen.<br>Lidocaïne moet voorzichtig worden gebruikt bij herhaalde hoge doseringen vanwege gebrek aan bewijs bij langdurig gebruik. Bij gebruik in een infuus wordt geadviseerd om lidocaïne in een glucoseoplossing toe te dienen vanwege de anti-porfyriogene eigenschappen van glucose. |
| <b>ref. 3</b><br>SPC lidocaïne HCl<br>CF (concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie)<br>01-11-10. |        | <u>Bw</u> : uitlokking van een aanval van porfyrie.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Opmerkingen:

-

|                |                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Risicofactoren | alcohol, dehydratie, endogene steroïden, energiearme diëten, infectie, koorts |
| Incidentie     | -                                                                             |

|                        | Contra-indicatie | Actie | Datum      |
|------------------------|------------------|-------|------------|
| Beslissing deskundigen | ja               | ja    | 22-05-2012 |