

Porfyrie: psoralenen

3990

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Website van het European Porphyrria Initiative. www.porphyrria-europe.com	review	Methoxsaleen en trioxysaleen staan noch op de lijst met onveilige middelen noch op de lijst met veilige middelen.
ref. 2 Website van het Noorse porfyriecentrum NAPOS. www.drugs-porphyrria.com	review	Methoxsaleen is mogelijk porfyrinogeen. Alleen gebruiken als er geen veiliger alternatief is. Voorzorgsmaatregelen zijn nodig bij kwetsbare patiënten.

Opmerkingen:

- Informatorium Medicamentorum: 'Het risico op systemische bijwerkingen van cutane UVA-behandeling is beduidend lager dan bij orale toediening van methoxsaleen.'
- Informatorium Medicamentorum: 'Methoxsaleen is gecontraïndiceerd bij aandoeningen die met fotosensibilisatie gepaard gaan (bijvoorbeeld porfyrie).' Het gaat dus kennelijk meer om de combinatie met UVA-behandeling dan om methoxsaleen zelf.
- Projectgroep: Omdat er alternatieven zijn die in tegenstelling tot methoxsaleen niet gepaard gaan met UVA-behandeling, is besloten om een contra-indicatiebewaking op te nemen. Tevens is om deze reden besloten om zowel op orale als cutane toediening van methoxsaleen te bewaken.

Risicofactoren	alcohol, dehydratie, endogene steroïden, energiearme diëten, infectie, koorts
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	ja	ja	22-05-2012