

Porfyrie: clobazam, clonazepam

3997

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Tatum WO et al. Gabapentin treatment of seizures in acute intermittent porphyria. Neurology 1995;45:1216-7.	casus n=1	Een patiënt kreeg bij behandeling met de volgende anticonvulsiva symptomen van acute intermitterende porfyrie zoals buikpijnaanvallen, misselijkheid en overgeven: fenytoïne, carbamazepine, valproïnezuur, clonazepam en fenobarbital. Bij behandeling met gabapentine 2100 mg/dag normaliseerden de porfyrinewaarden en was hij klachtenvrij.
ref. 2 Disler PB et al. Guidelines for drug prescription in patients with the acute porphyrias. S Afr Med J 1982;61:656-60.	review	De auteurs geven aan dat er voor clonazepam geen consensus is of dit veilig of onveilig is bij porfyrie. Het artikel vermeldt geen enkele referentie met betrekking tot clonazepam.
ref. 3 Website van het European Porphyria Initiative. www.porphyria-europe.com	review	Clobazam en clonazepam staan op de lijst met veilige middelen.
ref. 4 Website van het Noorse porfyriecentrum NAPOS. www.drugs-porphyria.com	review	Clobazam is nog niet geclassificeerd. Clonazepam is waarschijnlijk niet porfyrinogeen. Dit betekent dat het een eerstekeuzemiddel bij porfyriepatiënten is. Er zijn geen voorzorgsmaatregelen nodig.

Opmerkingen:

- SPC's Rivotril (clonazepam) 26-02-09, Frisium (clobazam) 27-06-08 geven geen informatie.

Risicofactoren	alcohol, dehydratie, endogene steroïden, energiearme diëten, infectie, koorts
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	nee	nee	22-05-2012