

Bron	Studie	Effect
ref. 1 Website van het European Porphyria Initiative. www.porphyria-europe.com.	review	Aluminiumzouten staan op de lijst met veilige middelen.
ref. 2 Website van het Noorse porfyriecentrum NAPOS. www.drugs-porphyria.com	review	Aluminiumzouten zijn nog niet geclassificeerd.
ref. 3 Fisher AA. Reactions to aluminium and its salts. Cutis 1984;33:154,159.	review	Brivet, 1978 beschreef dat 6 van 500 patiënten op hemodialyse 2-54 weken na dialysestart symptomen ontwikkelden die op porphyria cutanea tarda leken. Alle 6 patiënten hadden aluminiumhydroxidegel gebruikt. 4 van de 6 patiënten hadden normale plasmaconcentraties aluminium. In de review Goldsman, 1983 vermeldden de auteurs een toenemende incidentie van porphyria cutanea tarda bij patiënten met verminderde nierfunctie. Afwijkingen in de porfyriesynthese werden niet in alle gevallen gevonden. Thivolet, 1982 gaf aan dat patiënten op nierdialyse mogelijk blootgesteld zijn aan geneesmiddelen die de heemsynthese in de lever beïnvloeden, waaronder aluminiumhydroxide en weekmakers uit de buizen en apparaten waar het bloed gedurende de dialyse doorheen stroomt. Chronische toediening van aluminiumhydroxide veroorzaakt bij ratten porfyrie.

Opmerkingen:

- De SPC's van Antagel PCH (algeldraat/magnesiumhydroxide) 31-03-03, Regla pH (aluminiumhydroxidemagnesiumcarbonaat) 11-06-07 en Ultacit (hydrotalciet) 21-08-06 bevatten geen informatie.

Risicofactoren	alcohol, dehydratie, endogene steroïden, energiearme diëten, infectie, koorts
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	nee	nee	22-05-2012