

Tuberculose: BCG-vaccin

4111

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 SPC BCG vaccin SSI (Bacillus Calmette-Guérin = levend verzwakte stam van Mycobacterium bovis) 14-11-11.		<u>CI</u> : BCG-vaccin mag niet worden toegepast bij personen met een positieve reactie van Mantoux.
ref. 2 SPC BCG-medac (Bacillus Calmette-Guérin) 17-11-10.		<u>CI</u> : BCG-medac mag niet toegediend worden aan personen met actieve tuberculose. Het risico van actieve tuberculose moet uitgesloten worden door middel van passende anamnese en indien geïndiceerd door middel van diagnostische tests conform lokale richtlijnen.

Opmerkingen:

- Geen literatuur gevonden (PubMed). Gezien de toepassing en bijwerkingen waren er echter geen geschikte zoektermen om artikelen over toediening aan patiënten met latente of actieve tuberculose te selecteren. Het vaccin wordt gebruikt om te vaccineren tegen tuberculose. Zowel het vaccin als de blaasspoeling voor behandeling van blaaskanker kunnen leiden tot tuberculose ten gevolge van Mycobacterium bovis.
- Projectgroep: Er is geen literatuur gevonden, maar er kon niet gericht worden gezocht op toediening aan patiënten met latente of actieve tuberculose. Toediening van vaccins aan patiënten die al geïnfecteerd zijn, is in de regel niet zinvol. Daarnaast kan bij actieve tuberculose onderdrukking van de immuunafweer (door behandeling met corticosteroïden) leiden tot vermindering van ernstige symptomen. Dit betekent dat stimulering van de immuunafweer tegen tuberculose waarschijnlijk een ongunstig effect zal hebben bij patiënten met actieve tuberculose. Bij tuberculose veroorzaakt door M. bovis uit het BCG-vaccin, mag de blaasspoeling ook na succesvolle tuberculose-behandeling niet meer worden gegeven. Om deze redenen is besloten tot een ja/ja-bewaking.

Datum literatuursearch: 30-04-2013

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	ja	ja	27 mei 2013