

Angio-oedeem, niet-allergisch: bètalactamantibiotica

4175

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Hoefnagel JJ et al. Angio-oedeem en urticaria bij frequent gebruikte geneesmiddelen. Ned Tijdschr Geneesk 2010;154:A1854.	review	De verschillende vormen van angio-oedeem worden beschreven. Bij het gebruik van bètalactamantibiotica kan een IgE-gemedieerde reactie optreden. De prevalentie wordt geschat op 0,01-0,3% per voorgeschreven kuur. Een allergische reactie op deze antibiotica is de meest voorkomende IgE-gemedieerde geneesmiddelenreactie.

Opmerkingen:

- Niet-allergisch angio-oedeem geeft geen verhoogd risico op allergisch angio-oedeem.
- Er is geen PubMedsearch uitgevoerd omdat in bovengenoemd artikel beschreven wordt dat betalactamantibiotica allergisch angio-oedeem kunnen veroorzaken. Om deze reden zijn ook de SPC's van de bètalactamantibiotica niet geraadpleegd.

Datum literatuursearch: -

Risicofactoren	-
Incidentie	-

Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee 27-05-2013