

Angio-oedeem, niet-allergisch: P2Y12-remmers 4180

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Fischer TC et al. Clopidogrel-associated angioedema. Am J Med 2003;114:77-8.	casus n=1	Een 71-jarige man met chronisch ischemische hartziekte werd opgenomen in het ziekenhuis vanwege ritmestoornissen. De patiënt werd behandeld met acetylsalicylzuur, clopidogrel, verapamil en een statine. Hij ontwikkelde angio-oedeem en urticaria. Zes maanden later werden de geneesmiddelen placebogecontroleerd dubbelblind getest bij de patiënt. Hij ontwikkelde angio-oedeem 3 uur na inname van clopidogrel (2 x 18,75 mg) en werd hiervoor behandeld met corticosteroïden en antihistaminica. Onderzoek toonde aan dat de waarden voor C1-esteraseremmer, IgE, C3 en C4 normaal waren.
ref. 2 SPC Efient (prasugrel) 15-04-13.		<u>Waarschuwing:</u> Overgevoelighedsreacties waaronder angio-oedeem zijn gerapporteerd bij patiënten die prasugrel kregen, waaronder patiënten met een voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor clopidogrel. Geadviseerd wordt patiënten van wie bekend is dat ze een allergie hebben voor thienopyridines te monitoren op klachten van overgevoeligheid. <u>Bw:</u> Soms: overgevoeligheid waaronder angio-oedeem.
ref. 3 SPC Brilique (ticagrelor) 01-02-13.		<u>Bw:</u> Soms: Overgevoeligheid inclusief angio-oedeem.
ref. 4 SPC Plavix (clopidogrel) 31-05-12.		<u>Bw:</u> Zeer zelden: angio-oedeem.
ref. 5 SPC Kengrexal (cangrelor) 12-06-15.		<u>Waarschuwing:</u> Overgevoelighedsreacties kunnen zich voordoen na behandeling met Kengrexal. Een hoger percentage van ernstige gevallen van overgevoeligheid werd geregistreerd met cangrelor (0,05 %) dan met controlemedicatie (0,007 %). Deze omvatten gevallen van anafylactische reacties/shock en angiooedeem, <u>Bw:</u> zelden: angio-oedeem

Opmerkingen:

- Allergisch angio-oedeem kan optreden na toediening van clopidogrel, prasugrel of cangrelor. Allergisch angio-oedeem valt niet onder deze contra-indicatie. Niet-allergisch angio-oedeem geeft geen verhoogd risico op allergisch angio-oedeem.
- Het lijkt aannemelijk dat ticagrelor ook allergisch angio-oedeem kan geven.

Datum literatuursearch voor clopidogrel en prasugrel: 18-12-2012. Voor ticagrelor: 26-4-2013.

Risicofactoren	-
Incidentie	-

Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee 27-05-2013