

Slokdarmstenose: oraal clindamycine

4346

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Wagenvoort GHJ et al. Clindamycin induced esophageal ulceration. Endoscopy 2011;43:E383.	casus n=1	Een 24-jarige man zonder medische historie presenteerde zich met plotseling opkomende pijn op de borst. De pijn werd verergerd door slikken. De pijn was 6 dagen daarvoor begonnen terwijl de patiënt lag. 1 uur voordat de symptomen optraden had hij de laatste dosis van 3 tabletten clindamycine 300 mg genomen. 3 dagen pantoprazol 20 mg bracht geen verlichting. Een endoscopie liet een ulceratieve oesofageale laesie zien zonder tekenen van erosieve refluxoesofagitis. De klachten verdwenen spontaan binnen 4 dagen na de endoscopie. Een endoscopie 6 weken later gaf een normaal beeld. De diagnose was clindamycinegeïnduceerde ulcus.
ref. 2 Rivera Vaquerizo PA et al. Clindamycin-induced esophageal ulcer. Rev Esp Enferm Dig 2004;96:143-5.	casus n=1	Een 27-jarige man werd onderzocht vanwege slikproblemen en pijn bij het slikken gedurende een aantal uur. De patiënt nam sinds 5 dagen clindamycine in met een zeer kleine hoeveelheid water. Een endoscopie liet 4 ulcera zien. Vanwege de diagnose, mogelijke clindamycinegeïnduceerde ulcus, werd clindamycine gestopt en werden pantoprazol en sucralfaat gegeven. De symptomen verdwenen en 45 dagen later was op een endoscopie geen laesie meer te zien.
ref. 3 Sutton DR et al. Oesophageal ulceration due to clindamycin. Br Med J 1977;1:1598.	casus n=1	Een 22-jarige vrouw zonder dyspepsie ontwikkelde pijn na het slikken van een capsule met 150 mg clindamycine. De symptomen verergerden tot een complete slikstoornis voor vast voedsel en continue pijn. Na 1 week waren twee necrotische ulcera te zien op de endoscopie. Na 10 dagen op een neutraal dieet en een antacidum waren de symptomen bijna verdwenen. Endoscopie na 2 weken toonde compleet herstel.
ref SPC Dalacin (clindamycine) 17-12-12.		<u>Wijze van toediening:</u> Om mogelijke irritatie van de slokdarm te voorkomen kunnen de capsules het beste met een heel glas water ingenomen worden. <u>Bw:</u> Vaak: oesofagitis

Opmerkingen:

-

Datum literatuursearch: 02-07-2013

Risicofactoren	Verminderde speekselvloed, hoge leeftijd, inname in liggende positie en inname met onvoldoende vloeistof.
Incidentie	

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Ja	Ja	18-11-2013