

Slokdarmstenose: theofylline

4348

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Stoller JL. Oesophageal ulceration and theophylline. Lancet 1985;2:328-9.	casus n=1	Een 31-jarige vrouw nam haar theofyllinetablet liggend, bij het naar bed gaan, en zonder water. De volgende ochtend had de patiënt brandende pijn achter het borstbeen. Die dag was het niet mogelijk iets oraal in te nemen. Na 9 dagen liet endoscopie een oesofageale ulcus zien. De pijn nam langzaam af na een week grote hoeveelheden vloeibare antacida genomen te hebben. 20 dagen daarna liet endoscopie een normaal beeld zien van de oesofageale mucosa en waren de symptomen verdwenen. Er werd aangenomen dat theofylline de oorzaak was van de oesofageale ulcus omdat er geen bewijs was voor een andere oorzaak. Er is slechts 1 andere casus beschreven waarbij sprake was van een oesofageale ulcus door theofylline.

Opmerkingen:

- SPC Theolair (theofylline) 18-07-13 geeft geen informatie
- Theofylline vermindert de druk van de onderste slokdarmsfincter. Hierdoor kan refluxoesofagitis worden geïnduceerd of verergerd. Deze vorm van slokdarmschade is hier niet meegenomen omdat dit geen extra problemen oplevert bij patiënten met slokdarmstenose.

Datum literatuursearch: 14-08-2013

Risicofactoren	Verminderde speekselvloed, hoge leeftijd, inname in liggende positie en inname met onvoldoende vloeistof.
Incidentie	

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	18-11-2013