

Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding: benzoëzuur + salicylzuur

4385 t/m 4388

TIS = Teratologie Informatie Service

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 Lareb TIS. Geneesmiddelen bij Zwangerschap en Borstvoeding. http://www.lareb.nl/Teratologie/Naslagwerk-GZB.aspx . Geraadpleegd 06-02-2014	<i>zwangerschap</i> Er is onvoldoende ervaring met benzoëzuur. <i>borstvoeding</i> Er is onvoldoende ervaring met benzoëzuur + salicylzuur. Benzoëzuur + salicylzuur worden nauwelijks geabsorbeerd. Wanneer de borst moet worden behandeld, moet het gebied rond de tepel vóór het voeden eerst worden schoongemaakt.	<i>zwangerschap</i> Bij dermatomycosen gaat de voorkeur uit naar de lokale toepassing van clotrimazol, econazol, miconazol of nystatine. <i>borstvoeding</i> Gebruik van benzoëzuur afwegen tegen de mogelijke gezondheidsrisico's voor het kind. De voorkeur gaat uit naar lokaal gebruik van clotrimazol, econazol, ketoconazol, miconazol, nystatine en terbinafine.

	Effect	Actie	Datum
Beslissing KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum			14 februari 2014
Kinderwens (vrouw)*	onbekend	ja	
Zwangerschap	onbekend	ja	
Borstvoeding	onbekend	ja	
Kinderwens (man)**	onbekend	nee	

* Kinderwens, gebruik van het middel door de vrouw

**Kinderwens, gebruik van het middel door de man