

Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding: sucralfaat

4450 t/m 4453

TGA = Therapeutic Goods Administration; TIS = Teratologie Informatie Service

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 Lareb TIS. Geneesmiddelen bij Zwangerschap en Borstvoeding. http://www.lareb.nl/Teratologie/Naslagwerk-GZB.aspx . Geraadpleegd 13-03-2014	<i>zwangerschap</i> Met het gebruik van sucralfaat tijdens de zwangerschap is ruime ervaring. <i>borstvoeding</i> Sucralfaat wordt slechts in beperkte mate geresorbeerd.	<i>zwangerschap</i> Sucralfaat kan tijdens de zwangerschap in therapeutische doseringen gebruikt worden. Langdurig gebruik vermijden. <i>borstvoeding</i> Sucralfaat is een eerste keuze middel tijdens de borstvoeding.
ref. 2 Schaefer C et al. Drugs during pregnancy and lactation. Treatment options and risk assessment. Londen: Academic Press; 2007. p. 95-97, 648.	<i>zwangerschap</i> Sucralfaat is een wateroplosbaar aluminiumzout van gesulfateerde polysaccharide. De systemische absorptie van sucralfaat is verwaarloosbaar. <i>borstvoeding</i> Tijdens het gebruik van sucralfaat worden slechts sporen van aluminium geabsorbeerd. Chronische inname van kleine hoeveelheden aluminium kan problematisch zijn.	<i>kinderwens (vrouw)</i> Sucralfaat kan gedurende de hele zwangerschap gebruikt worden. <i>zwangerschap</i> Sucralfaat kan gedurende de hele zwangerschap gebruikt worden. <i>borstvoeding</i> Sucralfaat kan worden gebruikt bij borstvoeding.
ref. 3 TGA. Prescribing medicines in pregnancy database. http://www.tga.gov.au/hp/medicines-pregnancy.htm . Geraadpleegd 04-12-2012		Categorie B1: Geneesmiddelen die slechts door een beperkt aantal zwangere en vruchtbare vrouwen zijn gebruikt zonder dat een verhoogde incidentie van misvormingen of andere direct of indirect schadelijke effecten op de foetus zijn waargenomen. Onderzoek bij dieren heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor een verhoogde incidentie van foetale schade.
ref. 4 NVOG richtlijn Gastro-oesofageale refluxziekte in de zwangerschap, 2006	<i>zwangerschap en borstvoeding</i> Sucralfaat bevat een stabiele verbinding van aluminium en sacharine, waarbij aluminium niet wordt geresorbeerd.	Conclusie auteurs: <i>zwangerschap</i> Sucralfaat kan gedurende de hele zwangerschap gebruikt worden. <i>borstvoeding</i> Sucralfaat kan worden gebruikt bij borstvoeding.
ref. 5 SPC Ulcogant 24-04-2012	<i>kinderwens (vrouw)</i> Dierstudies geven geen aanwijzingen voor directe of indirecte schadelijke effecten met betrekking tot de embryofoetale ontwikkeling.	<i>zwangerschap</i> Op indicatie kan sucralfaat zonder bezwaar volgens het voorschrift tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

Bron	Effect	Opmerkingen
	<i>zwangerschap</i> Sucralfaat wordt slechts voor een klein gedeelte geabsorbeerd. Gegevens over gebruik tijdens een beperkt aantal zwangerschappen laten geen negatieve/schadelijke effecten zien van sucralfaat op de zwangerschap of op de gezondheid van de foetus/pasgeborene. Tot op heden zijn geen andere relevante epidemiologische gegevens beschikbaar. Dierstudies geven geen aanwijzingen voor directe of indirecte schadelijke effecten met betrekking tot de zwangerschap, embryofetale ontwikkeling, bevalling of postnatale ontwikkeling <i>borstvoeding</i> Het aluminiumbestanddeel van sucralfaat wordt uitgescheiden in de moedermelk. Een risico voor de pasgeborene is niet te verwachten, aangezien slechts kleine hoeveelheden worden geabsorbeerd.	<i>borstvoeding</i> Het is aan te raden om tijdens het geven van borstvoeding sucralfaat slechts te gebruiken na een zorgvuldige afweging van eventuele voor- en nadelen.

Opmerkingen:

In het 3^e trimester van de zwangerschap heeft 80% van de zwangeren last van zuurbranden. (NVOG)

	Effect	Actie	Datum
Beslissing KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum			03 april 2014
Kinderwens (vrouw)*	nee	ja	
Zwangerschap	nee	ja	
Borstvoeding	nee	ja	
Kinderwens (man)**	onbekend	nee	

* Kinderwens, gebruik van het middel door de vrouw

**Kinderwens, gebruik van het middel door de man