KNMP WINAp

Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding: bisacodyl

4487 t/m 4490

BHPM = bis-(p-hydroxyfenyl)-pyridyl-2-methaan; TGA = Therapeutic Goods Administration; TIS = Teratologie Informatie Service

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 Lareb TIS. Geneesmiddelen bij Zwangerschap en Borstvoeding. http://www.lareb.nl/Teratologie/Naslagwerk-GZB.aspx. Geraadpleegd 15-11-2012	*zwangerschap* Er is geen gedocumenteerde ervaring met het gebruik van bisacodyl tijdens de zwangerschap. In de praktijk wordt het echter regelmatig gebruikt. Bisacodyl wordt nauwelijks opgenomen vanuit het maag-darmkanaal. *borstvoeding* Bisacodyl en de actieve metaboliet worden nauwelijks opgenomen uit het maag-darmkanaal. De actieve metaboliet is niet meetbaar in de borstvoeding.	*zwangerschap* Bisacodyl kan kortdurend worden gebruikt, indien zwelmiddelen en lactulose onvoldoende werken. Chronisch gebruik wordt afgeraden. *borstvoeding* Bisacodyl kan kortdurend worden gebruikt, maar volumevergrotende middelen en osmotisch werkende middelen (lactitol, lactulose, natrium- en magnesiumzouten) verdienen de voorkeur. Bij gebruik tijdens de borstvoeding moet men alert zijn op het ontstaan van diarree bij de zuigeling.
ref. 2 Schaefer C et al. Drugs during pregnancy and lactation. Treatment options and risk assessment. Londen: Academic Press; 2007. p. 106, 652.	*zwangerschap* Bisacodyl behoort tot de groep difenylmethanen en heeft een laxerende werking door stimulatie van de darmperistaltiek. Slechts 5% van bisacodyl wordt geabsorbeerd. Er zijn geen teratogene of foetotoxische effecten waargenomen na gebruik van difenylmethanen. *borstvoeding* Bisacodyl wordt nauwelijks opgenomen uit het maagdarmkanaal.	*zwangerschap* Bisacodyl kan gedurende de gehele zwangerschap worden gebruikt, indien therapie met bulk of osmotische laxantia heeft gefaald. *borstvoeding* Bisacodyl kan worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.
ref. 3 TGA. Prescribing medicines in pregnancy database. http://www.tga.gov.au/hp/medicines-pregnancy.htm. Geraadpleegd 15-11-2012		Categorie A: Geneesmiddelen die door een groot aantal zwangere en vruchtbare vrouwen zijn gebruikt zonder dat een verhoogde incidentie van misvormingen of andere direct of indirect schadelijke effecten op de foetus zijn aangetoond.
ref. 4 SPC Dulcolax 10-10-2011.	*zwangerschap* De uitgevoerde studies geven onvoldoende informatie over gebruik door zwangere vrouwen. Lange ervaring heeft tot dusver geen aanwijzingen gegeven voor ongewenste of schadelijke effecten bij gebruik van bisacodyl tijdens de zwangerschap. *borstvoeding* Uit klinische gegevens blijkt dat zowel het actieve	*zwangerschap* Bisacodyl kan gedurende de zwangerschap gebruikt worden indien strikt noodzakelijk. *borstvoeding* Bisacodyl kan gebruikt worden tijdens het geven van borstvoeding.

Bron	Effect	Opmerkingen
	deel van bisacodyl BHPM als zijn glucuroniden niet worden uitgescheiden in de moedermelk van gezonde vrouwen die borstvoeding geven.	

Opmerkingen:
Obstipatie komt bij 11-38% van de zwangere vrouwen voor. (Bánhidy F. et al. 2008)

	Effect	Actie	Datum
Beslissing KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum			21 mei 2014
Kinderwens (vrouw)*	nee	ja	
Zwangerschap	nee	ja	
Borstvoeding	nee	ja	
Kinderwens (man)**	nee	nee	

* Kinderwens, gebruik van het middel door de vrouw
**Kinderwens, gebruik van het middel door de man