

Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding: natriumlaurylsulfoacetaat

4511 t/m 4514

TGA = Therapeutic Goods Administration; TIS = Teratologie Informatie Service

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 Lareb TIS. Geneesmiddelen bij Zwangerschap en Borstvoeding. http://www.lareb.nl/Teratologie/Naslagwerk-GZB.aspx . Geraadpleegd 01-03-2013		<i>zwangerschap</i> Natriumlaurylsulfoacetaat kan incidenteel worden gebruikt bij obstipatie. <i>borstvoeding</i> Natriumlaurylsulfoacetaat kan kortdurend worden gebruikt bij tijdens de borstvoeding.
ref. 2 SPC microlax.03-07-2009		<i>zwangerschap en borstvoeding</i> Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeden.

Opmerkingen:

Obstipatie komt voor bij een derde van de zwangere vrouwen. Dit verschijnsel wordt waarschijnlijk veroorzaakt door hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap. (TIS, Schaefer)

	Effect	Actie	Datum
Beslissing KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum			21 mei 2014
Kinderwens (vrouw)*	nee	ja	
Zwangerschap	nee	ja	
Borstvoeding	nee	ja	
Kinderwens (man)**	nee	nee	

* Kinderwens, gebruik van het middel door de vrouw

**Kinderwens, gebruik van het middel door de man