

Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding: lactitol

4515 t/m 4518

TGA = Therapeutic Goods Administration; TIS = Teratologie Informatie Service

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 Lareb TIS. Geneesmiddelen bij Zwangerschap en Borstvoeding. http://www.lareb.nl/Teratologie/Naslagwerk-GZB.aspx . Geraadpleegd 01-03-2013.	<i>borstvoeding</i> Lactitol wordt nauwelijks of slechts gering geresorbeerd uit het maag-darmkanaal.	<i>zwangerschap en borstvoeding</i> Lactitol kan worden gebruikt tijdens de zwangerschap en borstvoeding.
ref. 2 Schaefer C et al. Drugs during pregnancy and lactation. Treatment options and risk assessment. Londen: Academic Press; 2007. p. 105-6, 652-3.	<i>zwangerschap</i> Lactitol verhoogt de osmotische druk. Hierdoor wordt water aangetrokken, waardoor de darminhoud zich uitzet, wat de stoelgang bevordert.	<i>zwangerschap</i> Lactitol kan worden gebruikt tijdens de zwangerschap. De bulkvormers en lactulose zijn de middelen van eerste keus bij obstipatie tijdens de zwangerschap. <i>borstvoeding</i> Volumevergrotenende en osmotische laxantia, sennapreparaten, bisacodyl mogen gebruikt worden tijdens de borstvoeding.
ref. 3 NHG. standaard Obstipatie, 2010.	Het beleid bij obstipatieklachten die optreden tijdens de zwangerschap is gelijk als het beleid bij functionele obstipatie.	Conclusie auteurs: <i>zwangerschap</i> Lactitol is een alternatief voor lactulose, wat het middel van eerste keus bij functionele obstipatie is.
ref. 4 SPC Importal, 23-11-2011.	<i>kinderwens (vrouw)</i> Er zijn geen nadelige effecten op de vruchtbaarheid bekend. <i>zwangerschap</i> Er zijn beperkte gegevens over het gebruik van lactitol tijdens de zwangerschap. Dierstudies geven geen aanwijzingen voor nadelige effecten wat betreft reproductie <i>borstvoeding</i> Gezien de verwaarloosbare systemische blootstelling van de moeder aan lactitol worden geen effecten op de zuigeling verwacht <i>kinderwens (man)</i> Er zijn geen nadelige effecten op de vruchtbaarheid bekend.	<i>zwangerschap</i> Indien noodzakelijk kan lactitol worden gebruikt tijdens de zwangerschap. <i>borstvoeding</i> Lactitol kan gebruikt worden tijdens het geven van borstvoeding.

Opmerkingen:

Obstipatie komt voor bij een derde van de zwangere vrouwen. Dit verschijnsel wordt waarschijnlijk veroorzaakt door hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap. (Schaefer, NHG.Standaard Zwangerschap en kraamperiode 2012.)

	Effect	Actie	Datum
Beslissing KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum			21 mei 2014
Kinderwens (vrouw)*	nee	ja	
Zwangerschap	nee	ja	
Borstvoeding	nee	ja	
Kinderwens (man)**	nee	nee	

* Kinderwens, gebruik van het middel door de vrouw

**Kinderwens, gebruik van het middel door de man