

Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding: Dinatriumwaterstoffosfaat/ Natriumdiwaterstoffosfaat

4535 t/m 4542

TGA = Therapeutic Goods Administration; TIS = Teratologie Informatie Service

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 Lareb TIS. Geneesmiddelen bij Zwangerschap en Borstvoeding. http://www.lareb.nl/Teratologie/Naslagwerk-GZB.aspx . Geraadpleegd 14-03-2013.	<i>borstvoeding</i> Fosfaatklysma's worden nauwelijks of slechts gering geresorbeerd uit het maagdarmkanaal.	<i>zwangerschap</i> Fosfaatklysma's kunnen eenmalig voor colonlavage worden gebruikt. Langdurig gebruik wordt afgeraden. <i>borstvoeding</i> Fosfaatklysma's kunnen eenmalig worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.
ref. 2 NHG.standaard Obstipatie, 2010	Het beleid bij obstipatieklachten die optreden tijdens de zwangerschap is gelijk aan het beleid bij functionele obstipatie.	Conclusie auteurs: <i>zwangerschap</i> Lactulose en macrogol zijn de middel van eerste keus bij functionele obstipatie. Indien het middel van eerste keus onvoldoende werkzaam is, kan een andere osmotisch werkende laxans worden toegepast.
ref. 3 SPC Colex, 17-12-2010.	<i>zwangerschap</i> Er zijn geen adequate gegevens over het gebruik van fosfaatklysma's door zwangere vrouwen.	<i>zwangerschap</i> Fosfaatklysma kan eenmalig worden gebruikt. Herhaald gebruik wordt ontraden wegens mogelijke verstoring van de calcium-/fosforbalans in de moeder en de foetus. <i>borstvoeding</i> Fosfaatklysma kan voor zover bekend zonder gevaar voor de zuigeling worden gebruikt tijdens de periode van lactatie.
ref. 4 SPC Phosphoral, 10 - 06-2011.	<i>zwangerschap</i> Er zijn geen klinische gegevens bekend van bij zwangerschap noch zijn er gegevens uit dierstudies beschikbaar met betrekking tot effect op zwangerschap, embryonale/foetale ontwikkeling, bevalling en postnatale ontwikkeling. Het mogelijke risico bij de mens is onbekend. <i>borstvoeding</i> Het is onbekend of dit geneesmiddel in de moedermelk wordt uitgescheiden. Aangezien natriumfosfaat	<i>zwangerschap</i> De drank dient niet toegepast te worden tijdens de zwangerschap tenzij echt noodzakelijk. <i>borstvoeding</i> Vrouwen dienen hun kinderen geen borstvoeding te geven tot 24 uur na de tweede dosis van de drank.

Bron	Effect	Opmerkingen
	terecht kan komen in de moedermelk, wordt aanbevolen de moedermelk te verzamelen en weg te gooien vanaf de eerste dosis tot 24 uur na de tweede dosis van het darmreinigingsmiddel.	

Opmerkingen:

Obstipatie komt voor bij een derde van de zwangere vrouwen. Dit verschijnsel wordt waarschijnlijk veroorzaakt door hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap. (Schaefer, NHG.Standaard Zwangerschap en kraamperiode.2012)

	Effect	Actie	Datum
Beslissing KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum			21 mei 2014
Kinderwens (vrouw)*	onbekend	ja	
Zwangerschap	onbekend	ja	
Borstvoeding	onbekend	ja	
Kinderwens (man)**	nee	nee	

* Kinderwens, gebruik van het middel door de vrouw

**Kinderwens, gebruik van het middel door de man