

Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding: sterculiagom

4551 t/m 4554

TGA = Therapeutic Goods Administration; TIS = Teratologie Informatie Service

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 Lareb TIS. Geneesmiddelen bij Zwangerschap en Borstvoeding. http://www.lareb.nl/Teratologie/Naslagwerk-GZB.aspx . Geraadpleegd 01-03-2013	<i>zwangerschap en borstvoeding</i> Sterculiagom wordt niet opgenomen vanuit het maagdarmkanaal.	<i>Zwangerschap & borstvoeding</i> Sterculiagom kan worden gebruikt tijdens de zwangerschap en tijdens de lactatie.
ref. 2 Schaefer C et al. Drugs during pregnancy and lactation. Treatment options and risk assessment. Londen: Academic Press; 2007. p. 105.	<i>zwangerschap</i> Volumevergroterende middelen worden niet opgenomen in het maagdarmkanaal. Deze middelen zwellen op bij aanraking met water en stimuleren zo de darmperistaltiek.	<i>zwangerschap</i> Alle volumevergroterende laxantia zijn veilig in gebruik tijdens de zwangerschap en hebben de voorkeur.
ref. 3 SPC Normacol, 31-05-2011	<i>kinderwens (vrouw)</i> Er zijn geen gegevens met betrekking tot het effect van sterculiagom op de vruchtbaarheid.	<i>zwangerschap & borstvoeding</i> Sterculiagom kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht of de pasgeborene, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap en tijdens de lactatie.

Opmerkingen:

Obstipatie komt voor bij een derde van de zwangere vrouwen. Dit verschijnsel wordt waarschijnlijk veroorzaakt door hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap.

	Effect	Actie	Datum
Beslissing KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum			21 mei 2014
Kinderwens (vrouw)*	nee	ja	
Zwangerschap	nee	ja	
Borstvoeding	nee	ja	
Kinderwens (man)**	nee	nee	

* Kinderwens, gebruik van het middel door de vrouw

**Kinderwens, gebruik van het middel door de man