

Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding: dextromoramide

4584 t/m 4587

TGA = Therapeutic Goods Administration; TIS = Teratologie Informatie Service

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 Lareb TIS. Geneesmiddelen bij Zwangerschap en Borstvoeding. http://www.lareb.nl/Teratologie/Naslagwerk-GZB.aspx . Geraadpleegd 17-10-2012	<i>zwangerschap</i> Tot nu toe bestaan er geen eenduidige aanwijzingen voor een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen bij gebruik van opioïden in de vroege zwangerschap. Gebruik van opioïden vlak vóór de bevalling wordt ontraden, in verband met het mogelijk optreden van ademhalingsdepressie bij de neonat. Bij langdurig gebruik van opioïden in het derde trimester kunnen onthoudingsverschijnselen bij de neonat optreden. <i>borstvoeding</i> Er is onvoldoende bekend over het gebruik van dextromoramide tijdens de borstvoeding. Langdurig gebruik van opioïden moet worden vermeden. Het grootste gevaar is het optreden van ademhalingsdepressie bij de zuigeling. Opiaten kunnen door een remmend effect op de afgifte van oxytocine in de hersenen de toeschietreflex verminderen.	<i>zwangerschap</i> Gebruik van dextromoramide afwegen. Bij gebruik controleren op nadelige effecten. Opioïden mogen op strikte indicatie gebruikt worden, mits kortdurend en in een zo laag mogelijke effectieve dosis. <i>borstvoeding</i> Borstvoeding en gebruik van dextromoramide zijn niet veilig te combineren. Bij voorkeur een veiliger geneesmiddel kiezen, anders borstvoeding (tijdelijk) stoppen.
ref. 2 TGA. Prescribing medicines in pregnancy database. http://www.tga.gov.au/hp/medicines-pregnancy.htm . Geraadpleegd 17-10-2012	Opioïde analgetica kunnen ademhalingsrepressie veroorzaken in de pasgeborene. Ontwenningverschijnselen in de pasgeborene zijn gemeld bij langdurig gebruik van geneesmiddelen uit deze groep.	Categorie C: Geneesmiddelen waarvan bekend is of waarvan op basis van hun farmacologische effecten wordt aangenomen, dat zij schadelijke effecten veroorzaken bij de foetus of neonat zonder misvormingen te veroorzaken.
ref. 3 SPC Palfium, 08-01-2008	<i>kinderwens (vrouw)</i> Bij 0,1-1% is verminderde libido gemeld. <i>zwangerschap</i> Beperkte ervaring met gebruik van dextromoramide gedurende zwangerschap laat geen verhoogde incidentie zien van aangeboren afwijkingen. Gebruik van dextromoramide vlak voor de partus kan resulteren in ademhalingsdepressie van de pasgeborene. Gegevens uit dierstudies tonen aan dat dextromoramide terotogene effecten kan geven bij hoge doseringen in muizen. <i>borstvoeding</i> Op basis van de lipofiliteit van dextromoramide kan worden verwacht, dat het wordt uitgescheiden in	<i>zwangerschap</i> Terughoudendheid moet worden getracht bij gebruik tijdens de zwangerschap. <i>borstvoeding</i> Langdurig gebruik van dextromoramide tijdens het geven van borstvoeding wordt ontraden

Bron	Effect	Opmerkingen
	de moedermelk. Langdurig gebruik van dextromoramide tijdens de borstvoeding wordt ontraden, wegens de mogelijke sederende en of ademhalingdempende effecten bij het kind. <i>kinderwens (man)</i> Bij 0,1-1% zijn verminderde libido en potentie gemeld.	

Opmerkingen:

- Gebruik van opioïden vlak voor de bevalling wordt ontraden, i.v.m. het mogelijke optreden van ademhalingdepressie bij de neonat. De laatste twee tot drie uren voor de verwachte partus dienen deze middelen alleen toegediend te worden nadat het nut voor de moeder is afgewogen tegen de mogelijke risico's voor de foetus. (Schaefer)
- Kinderen die worden geboren en zijn blootgesteld aan opiaten hebben over het algemeen een lager geboortegewicht, een kleinere omtrek van het hoofd. Ook zijn deze kinderen over het algemeen kleiner dan kinderen die niet zijn blootgesteld aan opiaten. (GGZ richtlijn Opiatoonderhoudsbehandeling)

	Effect	Actie	Datum
Beslissing KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum			17-06-2014
Kinderwens (vrouw)*	onbekend	ja	
Zwangerschap	ja	ja	
Borstvoeding	ja	ja	
Kinderwens (man)**	onbekend	nee	

* Kinderwens, gebruik van het middel door de vrouw

**Kinderwens, gebruik van het middel door de man