

Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding: ambroxol

4730 t/m 4733

TGA = Therapeutic Goods Administration; TIS = Teratologie Informatie Service.

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 Lareb TIS. Geneesmiddelen bij Zwangerschap en Borstvoeding. http://www.lareb.nl/Teratologie/Naslagwerk-GZB.aspx . Geraadpleegd 11-04-2014	<i>zwangerschap</i> Er bestaat ruime ervaring met het gebruik van ambroxol in hoestmiddelen tijdens de zwangerschap. <i>borstvoeding</i> Hoewel gegevens over de farmacokinetiek veelal ontbreken, is er wel veel ervaring met het gebruik van ambroxol. Nadelige effecten op de zuigeling zijn nooit gemeld.	<i>zwangerschap</i> Ambroxol kan worden gebruikt tijdens de zwangerschap. <i>borstvoeding</i> Ambroxol is veilig te combineren met het geven van borstvoeding.
ref. 2 Schaefer C et al. Drugs during pregnancy and lactation. Treatment options and risk assessment. Londen: Academic Press; 2007. p. 72, 644.	<i>zwangerschap</i> Ambroxol wordt toegepast bij de preventie van neonatale ademhalingsdepressie. Hierbij zijn geen bijwerkingen gemeld die optreden bij moeder en kind. <i>borstvoeding</i> Ambroxol wordt vaak toegepast tijdens het geven van borstvoeding en goed getolereerd door de zuigeling. Er zijn geen farmacokinetische gegevens bekend.	<i>zwangerschap</i> De mucolytica acetylcysteïne, ambroxol en broomhexine zijn middelen van eerste keus tijdens de zwangerschap. <i>borstvoeding</i> Acetylcysteïne, ambroxol en broomhexine zijn middelen van eerste keus tijdens het geven van borstvoeding.
ref. 3 SPC Mucoangin, 18-04-2011.	<i>kinderwens (vrouw, man)</i> Dierstudies laten geen directe of indirecte schadelijke effecten op de vruchtbaarheid zien. <i>zwangerschap</i> Ambroxol passeert de placenta. Uitgebreide klinische ervaring na de 28ste week van de zwangerschap geeft geen aanwijzing voor schadelijke effecten op de foetus. Dierstudies geven geen aanwijzingen voor directe of indirecte schadelijke effecten met betrekking tot de zwangerschap, embryonale/foetale ontwikkeling, bevalling of postnatale ontwikkeling. <i>borstvoeding</i> Ambroxol gaat over in de moedermelk. Nadelige effecten voor de zuigeling zijn nietwaarschijnlijk.	<i>zwangerschap</i> De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap dienen in acht te worden genomen. Met name gedurende het eerste trimester wordt ambroxol niet aanbevolen. <i>borstvoeding</i> Ambroxol wordt niet aanbevolen aan vrouwen die borstvoeding geven.

Opmerkingen:

Ambroxol is een metaboliet van broomhexine. (Schaefer 2007, Informatorium 2014)

	Effect	Actie	Datum
Beslissing KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum			14 augustus 2014
Kinderwens (vrouw)*	onbekend	ja	
Zwangerschap	onbekend	ja	
Borstvoeding	nee	ja	
Kinderwens (man)**	onbekend	nee	

* Kinderwens, gebruik van het middel door de vrouw

**Kinderwens, gebruik van het middel door de man