

Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding: myrtus

4750 t/m 4753

TGA = Therapeutic Goods Administration; TIS = Teratologie Informatie Service.

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 Lareb TIS. Geneesmiddelen bij Zwangerschap en Borstvoeding. http://www.lareb.nl/Teratologie/Naslagwerk-GZB.aspx . Geraadpleegd 15-04-2014.	<i>zwangerschap</i> Er is onvoldoende bekend over het gebruik van myrtol tijdens de zwangerschap om de risico's ervan te bepalen. <i>borstvoeding</i> Er is geen gedocumenteerde ervaring over het gebruik van myrtol tijdens het geven van borstvoeding.	<i>zwangerschap</i> Gebruik van myrtol afwegen. Bij voorkeur kiezen voor een geneesmiddel waarvan meer bekend is over de risico's. Vervang het middel bij voorkeur door acetylcysteïne, broomhexine of carbocysteïne. <i>borstvoeding</i> Borstvoeding en gebruik van myrtus zijn niet veilig te combineren. Bij voorkeur een veiliger geneesmiddel kiezen, anders borstvoeding (tijdelijk) stoppen.
ref. 2 Schaefer C et al. Drugs during pregnancy and lactation. Treatment options and risk assessment. Londen: Academic Press; 2007. p. 72, 644.	<i>borstvoeding</i> Preparaten met essentiële oliën zoals myrtol worden waarschijnlijk goed verdragen door de zuigeling. Er zijn echter geen gegevens uit studies hiervan bekend. Essentiële oliën kunnen de smaak van de moedermelk veranderen, wat kan leiden tot voedingsproblemen.	<i>zwangerschap</i> De mucolytica acetylcysteïne, ambroxol en broomhexine zijn middelen van eerste keus tijdens de zwangerschap. <i>borstvoeding</i> Acetylcysteïne, ambroxol en broomhexine zijn middelen van eerste keus tijdens het geven van borstvoeding.
ref. 3 SPC Gelodurat 14-03-2013.	<i>zwangerschap</i> Met betrekking tot myrtol zijn geen klinische data beschikbaar. Dierstudies gaven geen aanwijzingen voor directe of indirecte schadelijke effecten met betrekking tot de zwangerschap, embryofetale ontwikkeling, bevalling of postnatale ontwikkeling. <i>borstvoeding</i> In ratten werden hoge concentraties myrtolcomponenten uitgescheiden in de moedermelk.	<i>zwangerschap</i> Men dient terughoudend te zijn met het voorschrijven van myrtol aan zwangere vrouwen. <i>borstvoeding</i> Gedurende het gebruik van myrtol dient men de borstvoeding te staken.

Opmerkingen:

Myrtol = gestandaardiseerde olie uit de bladeren van de Myrtus communis. De gestandaardiseerde olie bevat voornamelijk limoneen, cineol en α -pineen in een verhouding 4:4:1. (Informatorium 2014)

	Effect	Actie	Datum
Beslissing KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum			14 augustus 2014
Kinderwens (vrouw)*	onbekend	ja	
Zwangerschap	onbekend	ja	
Borstvoeding	onbekend	ja	
Kinderwens (man)**	onbekend	nee	

* Kinderwens, gebruik van het middel door de vrouw

**Kinderwens, gebruik van het middel door de man