

Inflammatoire darmziekten: parasymphathicolytica

4860

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 SPC Detrusitol (tolterodine) 11-09-13 e.a.*.		<u>Cl</u> : ernstige colitis ulcerosa, toxisch megacolon. <u>Bw</u> : vaak: obstipatie, diarree.
ref. 2 SPC Emselex (darifenacine) 19-03-14.		<u>Cl</u> : ernstige colitis ulcerosa, toxisch megacolon. <u>Waarschuwing</u> : ernstige constipatie of gastrointestinale obstructie. <u>Bw</u> : zeer vaak: constipatie, soms: diarree.
ref. 3 SPC Vesicare (solifenacine) 25-11-13.		<u>Cl</u> : ernstige gastro-intestinale aandoening (met inbegrip van toxisch megacolon) <u>Bw</u> : vaak: obstipatie.
ref. 4 SPC Urispas (flavoxaat) 01-06-12		<u>Bw</u> : frequentie niet bekend: constipatie (bij hoge doses).
ref. 5 SPC atropinesulfaat PCH 11-09-13.		<u>Cl</u> : colitis ulcerosa. <u>Bw</u> : frequentie onbekend: obstipatie.
ref. 5 SPC Buscopan (butylscopolamine) 22-02-13.		<u>Cl</u> : megacolon of ileus.

* SPC Toviaz (fesoterodine) 11-10-12 en SPC Dridase (oxybutynine) 01-06-12

Opmerkingen:

- SPC's Betmiga en Scopoderm geven geen informatie.
- Geen literatuur gevonden (PubMed).

Datum literatuursearch: 31-07-2014

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	04-11-2014