

Inflammatoire darmziekten: lomitapide 4863

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 SPC Lojuxta (lomitapide) 08-10-14.		<p><u>CI</u>: patiënten met een bekende significante of chronische darmaandoening zoals inflammatoire darmziekte.</p> <p><u>Bw</u>: De meest voorkomende bijwerkingen waren maag-darmeffecten. Gastro-intestinale bijwerkingen werden gemeld door 27 (93%) van de 29 patiënten in het klinische fase 3-onderzoek. Bij 79% van de patiënten trad diarree op. Andere reacties die door ten minste 20% van de patiënten werden gemeld, waren onder andere buikpijn, abdominaal ongemak, opgezette buik, verstopping en flatulentie.</p> <p>Ernstige gastro-intestinale bijwerkingen werden gemeld door 6 (21%) van de 29 patiënten in het klinische fase 3-onderzoek, waarvan de meest voorkomende bijwerkingen diarree (4 patiënten, 14%), braken (3 patiënten, 10%), en buikpijn, opgezette buik en/of abdominaal ongemak (2 patiënten, 7%) waren.</p>

Opmerkingen:

- Geen literatuur gevonden (PubMed).

Datum literatuursearch: 13-08-2014

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	04-11-2014