

BIVV = Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, DRUID = Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines

Bron	Effect	Opmerkingen
ref. 1 BIVV: Brochure en literatuurstudie: Invloed van geneesmiddelen op de rijvaardigheid. 1999.	Geen gegevens.	Algemeen advies bij anti-epileptica: Autorijden is verboden voor patiënten van wie de ziekte nog niet gestabiliseerd is en moet duidelijk afgeraden worden aan patiënten die zich niet bewust zijn van de effecten van hun ziekte en geneesmiddelen.
ref. 2 DRUID: Classification of medicinal drugs and driving: Co-ordination and synthesis report. 2011.	Categorie II: Matige invloed op de rijvaardigheid.	Informatie voor de patiënt: <ul style="list-style-type: none"> - adviseer de patiënt niet te gaan autorijden gedurende de 1^e paar dagen van de behandeling en als de dosering toeneemt. Algemene waarschuwingen: <ul style="list-style-type: none"> - adviseer de patiënt het medicijn in te nemen zoals de arts heeft voorgeschreven - adviseer de patiënt de medicatie niet plotseling te staken en indien hij/zij dat toch het gebruik moeten staken de (behandelend) arts te raadplegen. - Adviseer de patiënt geen alcohol te drinken tijdens de behandeling.
ref. 3 DRUID: Establishment of framework for classification/categorisation and labelling of medicinal drugs and driving annex 9: N03-antiepileptic medicines. 2010.	Bijwerkingen met mogelijke invloed op de rijvaardigheid: Zeer vaak (>10%): somnolentie, hoofdpijn, duizeligheid, Vaak (1-10%): status epilepticus, convulsie, abnormale coördinatie, nystagmus, psychomotorische hyperactiviteit, tremor, angst, slapeloosheid, vertigo, wazig zicht, diplopie.	
ref. 3 SPC Inovelon 06-08-2013.	Rufinamide kan duizeligheid, slaperigheid en wazig zien veroorzaken. Afhankelijk van de individuele gevoeligheid kan rufinamide een kleine tot grote invloed hebben op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Men dient patiënten te adviseren voorzichtig te zijn tijdens activiteiten waarvoor een hoge mate van alertheid, bijv. autorijden of het bedienen van machines, is vereist.	
	Bijwerkingen met invloed op de rijvaardigheid:	

	slaperigheid, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid (frequentie \geq 10%), angst, slapeloosheid, status epilepticus, convulsie, coördinatie abnormaal, nystagmus, psychomotorische hyperactiviteit, tremor, diplopie, wazig zien, vertigo, loopstoornis (frequentie 1-10%).	
--	---	--

Opmerkingen:

DRUID classificatiesysteem:

- Categorie 0: geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie I: weinig invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie II: matige invloed op de rijvaardigheid.
- Categorie III: ernstige invloed op de rijvaardigheid.

	Contra-indicatie	Actie	Categorie	Datum
Beslissing KNMP Geneesmiddel Informatiecentrum	Ja	Ja	II	26-11-2014