

Angina pectoris/ischemische hartziekte: ethinylestradiol/cyproteron 4888

Bron	Studie	Effect
ref. 1 Brief van de fabrikanten van ethinylestradiol/cyproteron. 19-06-13.		In overleg met de registratieautoriteiten en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, waarschuwen de fabrikanten de zorgverleners voor een verhoogd risico op veneuze en arteriële trombose. De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) heeft het tromboserisico beoordeeld en geconcludeerd dat dit is verhoogd. In de brief worden echter alleen gegevens genoemd die wijzen op een verhoogd risico op veneuze trombo-embolie. Met betrekking tot het risico op arteriële trombose en/of myocardinfarct wordt niets genoemd.
ref. 2 SPC Diane (ethinylestradiol/cyproteronaceetaat) 30-08-13.		<u>CI</u> : manifeste of eerder doorgemaakte arteriële trombose (zoals myocardinfarct) of prodromale aandoeningen (zoals angina pectoris en "transient ischaemic attack") <u>Waarschuwing</u> : Epidemiologische onderzoeken hebben het gebruik van hormonale anticonceptiva ook in verband gebracht met een verhoogd risico op arteriële trombo-embolische aandoeningen (myocardinfarct, transient ischaemic attack). <u>Bw</u> : zelden: trombo-embolie. De volgende ernstige bijwerkingen zijn gemeld bij vrouwen die Diane-35 gebruikten: arteriële trombo-embolische aandoeningen. Er is een verhoogde kans op het optreden van trombo-embolie voor alle vrouwen die Diane-35 gebruiken.

Opmerkingen:

- Geen literatuur gevonden (PubMed).
- Projectgroep: Er is onvoldoende onderbouwing voor een contra-indicatie.

Datum literatuursearch: 8 augustus 2013.

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	nee	nee	18 november 2013