

Astma: salicylaten (antitrombotisch)

5010

AIA: aspirin induced asthma, CI: 95% betrouwbaarheidsinterval.

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Jenkins C et al. Systematic review of prevalence of aspirin induced asthma and its implications for clinical practice. BMJ 2004;328:434.	meta-analyse	De gemiddelde incidentie van AIA is 21% (CI: 14-29%) bij volwassenen en 5% (CI: 0-14%) bij kinderen. 57 van de 113 patiënten met AIA kreeg een reactie bij lage dosis (80 mg acetylsalicylzuur). Kruisovergevoeligheid werd bij de meeste patiënten aangetoond (98% bij ibuprofen ≤ 400 mg, 100% bij naproxen ≤ 100 mg, 93% bij diclofenac ≤ 40 mg).
ref. 2 Registratiedossier (deel IB) Aspro cardio (acetylsalicylzuur) 17-01-05.		<u>CI</u> : astmatische patiënten, bij wie na het gebruik van acetylsalicylzuur of andere prostaglandinesynthetaseremmende middelen een astma aanval, bronchospasmen, acute rhinitis zijn opgetreden.

Opmerkingen:

- Voor de periode na 1997 is geen literatuur gevonden, die aanleiding geeft tot een wijziging van het besluit van de projectgroep en/of het advies.
- Projectgroep: Deze contra-indicatie geldt alleen voor astmapatiënten. Intolerantie kan opeens (ook na jaren van gebruik) optreden, ook in lage dosering.

Datum literatuursearch: 07-05-2010.

Risicofactoren	-
Incidentie	5-20% astmapatiënten (bron: NTVG 1988;132:2283-6).

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Ja	Ja	28-04-2004