

# Inflammatoire darmziekten: prostaglandine-analoga

5041

CD: ziekte van Crohn

| Bron                                                                                                                                     | Bewijs       | Effect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ref. 1</b><br>Paul S et al.<br>The role of latanoprost in an inflammatory bowel disease flare.<br>Gastroenterol Rep<br>2014;2:232-34. | casus<br>n=1 | Een 50-jarige vrouw met CD in remissie, werd voor glaucoom behandeld met latanoprost in 1 oog. Binnen 2 weken trad buikpijn en diarree op. Colonoscopie toonde progressie van CD. Met prednisolon was CD onder controle. Na starten van latanoprost in beide ogen trad binnen 8 weken exacerbatie van CD op. Ondanks behandeling trad geen remissie op. Na stoppen van latanoprost verdwenen de symptomen.<br><br>In een database werd gekeken naar de relatie tussen oculair prostaglandine-analogongebruik en het gebruik van IBD-medicatie. Nadat een IBD-patient gestart was met bimatoprost nam het gebruik van IBD-medicatie binnen 3 maanden met 30% toe. |
| <b>ref. 2</b><br>SPC Travatan (travoprost)<br>26-06-14                                                                                   |              | <u>Bw</u> : zelden constipatie; frequentie onbekend: diarree.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Opmerkingen:

- SPC's Lumigan (bimatoprost) 12-11-14, Xalatan (latanoprost) 12-12-13 en Saflutan (tafluprost) 31-07-14 geven geen informatie.

Datum literatuursearch: 17-02-2015

|                |   |
|----------------|---|
| Risicofactoren | - |
| Incidentie     | - |

|                        | Contra-indicatie | Actie | Datum      |
|------------------------|------------------|-------|------------|
| Beslissing deskundigen | Nee              | Nee   | 22-05-2015 |