

Bron	Bewijs	Effect
ref. 1 Hobbs SD et al. Smoking cessation strategies in patients with peripheral arterial disease: an evidence-based approach. Eur J Vasc Endovasc Surg 2003;26:341-7.	review	Er zijn weinig data over de effectiviteit van nicotinevervangings-therapie in specifieke subgroepen, zoals patiënten met cardio-vasculaire of perifeer arteriële ziekten. Ondanks dat wordt algemeen aangenomen dat nicotinevervangings-therapie veilig is en niet leidt tot een bovenmatig aantal cardiovasculaire gebeurtenissen.
ref. 2 McRobbie H et al. Nicotine replacement therapy in patients with cardiovascular disease: guidelines for health professionals. Addiction 2001;96:1547-51.	review	Nicotinevervangings-therapie is een effectieve hulp bij het stoppen met roken. Gebruik bij patiënten met cardiovasculaire ziekten wordt vaak vermeden vanwege waarschuwingen in de productinformatie. Dit is niet gerechtvaardigd, omdat gebruik van nicotinevervangings-therapie door verslaafde rokers veel veiliger is dan roken. Deze patiënten zou één van de best beschikbare mogelijkheden om te stoppen met roken niet onthouden mogen worden. Nicotinevervangings-therapie leidt tot veel lagere arteriële piekconcentraties dan nicotine afkomstig van sigarettenrook en heeft daardoor zwakkere cardiovasculaire effecten. Het leidt ook niet tot arteriële aandoeningen.
ref. 3 SPC Nicorette (nicotine) 06-05-15.		<u>Waarschuwing:</u> Nicorette kauwgom dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met ernstige cardiovasculaire aandoeningen (zoals occlusieve perifere arteriële aandoeningen).

Opmerkingen:

Datum literatuursearch: 23-09-15

Risicofactoren	-
Incidentie	-

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	19-11-2015