

Dialyse hemodialyse: norfloxacin

6358

HD = hemodialyse

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
Fillastre JP ea. Pharmacokinetics of norfloxacin in renal failure. J Antimicrob Chemother 1984;14:439.	2	$T_{1/2}$ 7,99 uur tussen HD-sessie. HD beïnvloedde $t_{1/2}$ niet. Pieks serumconcentraties onveranderd bij uremische patiënten, maar traden later op. Bij vijf patiënten die HD ondergingen en 1- malig oraal 400 mg norfloxacin kregen.	Auteurs: bij Clcr ≥ 20 ml/min 400 mg per 12 uur. Bij Clcr 2-10 ml/min: doseerinterval verdubbelen of dosis halveren.
Shimada J ea. Human and animal studies on the pharmacokinetics of norfloxacin in renal failure. Jpn J Antibiot 1986;39:2643-50. Artikel in Japans. Alleen abstract beschikbaar.	1	$T_{1/2}$ tijdens dialyse 8,8 uur, op niet- dialysedagen 7,0 uur, bij 5 patiënten die oraal norfloxacin kregen op dialyse en niet-dialysedagen.	Auteurs: HD geen invloed op de eliminatie van het geneesmiddel uit serum.

Overig	Opmerkingen
SCP norfloxacin PCH 1 mei 2014.	Bij verminderde nierfunctie gebruik norfloxacin zorgvuldig afwegen. Bij patiënten met Clcr ≤ 30 ml/min/1,73 m ² dagelijks dosis van één tablet aanbevelen.

Opmerkingen:

-

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Nee	Ja	5 juli 2016