

Dialyse peritoneaaldialyse: sotalol

6449

CAPD = continue ambulante peritoneale dialyse, PD = peritoneale dialyse

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC Sotalol Focus Farma 24 april 2014.	Vermijd gebruik bij Clcr<10 ml/min.
Tang S ea. Torsade de pointes in a CAPD patient-- successful treatment with intermittent peritoneal dialysis. Perit Dial Int 1997;17:207-8.	Auteurs beschrijven een casus waarin een 55-jarige vrouw op CAPD wegens nierfalen die sotalol kreeg, en 'torsade de points' (TDP) ontwikkelde. Alle medicatie, waaronder sotalol werd gestopt, terwijl de patiënt op CAPD bleef. De 5 volgende dagen trad TDP nog op. PD werd toegepast (2 uur-wisseling met 2 liter dialysevloeistof gedurende 12 cycli, gevolgd door 4 uur en 8 uur wisselingen gedurende 6 en 3 cycli. TDP-aanvallen hielden op, patiënt na 2 weken ontslagen. Conclusie auteurs: PD is een effectief middel om sotalol te elimineren (geen concrete data gegeven). Maar zolang er geen consensus is over een veilige dosis moet sotalol zoveel mogelijk worden vermeden bij nierfalen.

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	8 november 2016