

Dialyse peritoneaaldialyse: bezafibraat

6512

CAPD = continue ambulante peritoneale dialyse, CPK = creatinine-fosfokinase

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC Bezalip 4 november 2015.	Gecontraïndiceerd bij dialyse, zowel gewone als retardvorm.
Panuccio V ea. Severe rhabdomyolysis induced by a retard formulation of bezafibrate in a CAPD patient. Nephron 1996;73(4):736	Spierschade en extreem hoge myoglobinespiegels bij 64-jarige vrouw met polycystische nierziekte en type 2 diabetes en ernstige cardiovasculaire complicaties. Ze was al 4 jaar op CAPD en gebruikte sinds 6 dagen oraal 400 mg bezafibraat, in vertraagde afgiftevorm, per dag. Dit werd toegevoegd aan simvastatine. Na stoppen verdwenen de complicaties binnen een week Auteurs: langwerkend bezafibraat vermijden bij dialysepatiënten.
Chan MK. Sustained-release bezafibrate corrects lipid abnormalities in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis. Nephron 1990;56:56-61. Abstract. Studie niet in bezit GLC	24 patiënten op CAPD kregen 400 mg bezafibraat per dag in vertraagde afgiftevorm. 6 van hen ontwikkelden ernstige spierzwakte met sterk verhoogde CPK-activiteit binnen 3 weken. Na stoppen verdwenen de symptomen. De overige 18 patiënten werden gedurende 8 weken behandeld. Dat was genoeg om de behandeldoelinden te halen. Bezafibraat werd in deze dosering goed verdragen, geen significante verhoging CPK.

Opmerkingen:

-

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	24 januari 2017