



Schizofrenie/psychotische stoornis: co-dergocrine

6540

Datum literatuursearch: 8 maart 2017

CONCLUSIE

Er zijn geen aanwijzingen dat co-dergocrine mesilaat risico's op psychose verhoogt of dat verergering van schizofreniesymptomen optreedt.

In één kleine trial waarbij co-dergocrine mesilaat onderzocht wordt voor de behandeling van tardieve dyskinesie wordt geen verergering van schizofreniesymptomen gemeld.

Co-dergocrine mesilaat is geregistreerd voor symptomen van dementie, met name bij seniele dementie van het Alzheimerstype. Uit reviews blijkt dat het in de jaren 60/70 werd toegepast bij organisch brain syndrome, een inmiddels verlaten term voor psychiatrische aandoeningen met een meer fysieke oorsprong (delier, Alzheimer) ten opzichte van aandoeningen zoals depressie. Mogelijk is de contra-indicatie in de SPC opgenomen om aan te duiden dat dit middel geen eerste keuze is bij behandeling van wat nu geclassificeerd wordt als psychose.

AANVULLENDE OPMERKINGEN

- Geen relevante informatie in MDR richtlijn schizofrenie.

PICO

P(atient)	Patiënten met schizofrenie of psychotische stoornis (in de voorgeschiedenis)
I(ntervention)	Co-dergocrine mesilaat
C(omparison / Control)	Patiënten met schizofrenie of psychotische stoornis (in de voorgeschiedenis) zonder co-dergocrine mesilaat
O(utcome)	Verergering schizofrenie symptomen of optreden psychose.

PUBMED

Zoekterm:

(((((drug therapy OR medication)))) AND ((ergoloid mesylates[Title/Abstract] OR hydergine[Title/Abstract]))) AND ((psychosis[Title/Abstract] OR psychotic*[Title/Abstract] OR schizophren*[Title/Abstract] OR delusion*[Title/Abstract] OR hallucinat*[Title/Abstract] OR worsening[Title/Abstract])) AND ("Schizophrenia"[Mesh] OR "Psychotic Disorders"[Mesh] OR "Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders"[Mesh])

Vervolgens is er ook gezocht naar tardieve dyskinesie en co-dergocrine mesilaat, omdat patiënten met tardieve dyskinesie vaak aan schizofrenie lijden.

(((((drug therapy OR medication)))) AND ((ergoloid mesylates[Title/Abstract] OR hydergine[Title/Abstract]))) AND ((psychosis[Title/Abstract] OR psychotic*[Title/Abstract] OR schizophren*[Title/Abstract] OR delusion*[Title/Abstract] OR hallucinat*[Title/Abstract] OR worsening[Title/Abstract])) AND ("Tardive Dyskinesia"[Mesh])

Bron	Bewijs	Resultaten/Opmerkingen
ref. 1 Cohen et al. Hydergine for schizophrenia. J of Clin Psych 1987;48:39-40	Review [alleen abstract beschikbaar]	Resultaten Co-dergocrine mesilaat (hydergine) is toegediend aan 4 mannelijke patiënten met schizofrenie. De resultaten suggereren dat dit chronisch toegediend zou kunnen zonder verergering van psychose. Een klinisch relevant effect op negatieve symptomen lijkt onwaarschijnlijk.
ref. 2 Hajioff et al. Effect of co-dergocrine mesilate on tardive dyskinesia. A preliminary report. Psychopharmacology 1983;79:1-3	RCT n = 9 20 patiënten met tardieve dyskinesie (waarvan 9 met schizofrenie), die gerandomiseerd co-dergocrine mesilaat of placebo kregen.	Resultaten Er wordt niets gerapporteerd over verergering schizofrenie symptomen. Dit onderzoek is gericht op de behandeling van tardieve dyskinesie, waarover voorzichtig positieve resultaten gemeld worden. Opmerkingen Health Base Hoewel het aannemelijk is dat in dit onderzoek geen verergering van schizofrenie symptomen is opgetreden (immers, dan was dit gemeld), kan dit niet met zekerheid geconcludeerd worden.

OVERIGE

Bron	Resultaten/opmerkingen
ref. 3 SPC co-dergocrine mesilaat 8-3-2017	<u>CI</u> : psychosen
Mailwisseling Centrafarm (enige vergunninghouder)	Centrafarm geeft aan dat zij niet over meer achtergrondinformatie beschikken, omdat het dossier 40-50 jaar geleden is overgenomen en er destijds vermeld werd dat “de klinische ervaring algemeen bekend was”.

RISICOFACTOREN

Risicofactoren	-
----------------	---

	Contra-indicatie	Actie	Datum
Beslissing deskundigen	Nee	Nee	11 mei 2017