

Dialyse peritoneaaldialyse: captopril

6603

CAPD = continue ambulante peritoneale dialyse

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
Fujimura A, ea. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of captopril in patients undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis. Nephron 1986;44:324-8. Alleen abstract. Artikel niet beschikbaar via bibliotheken.	0	$T_{1/2}$ 1,0 uur tijdens CAPD (tov $t_{1/2}$ 2 uur bij normale nierfunctie (SPC)), captopril aangetroffen in dialysaat (% van dosis niet genoemd) bij alle vier de CAPD-patiënten na 1-malig 50 mg captopril oraal.	Auteurs: studieresultaten wijzen erop dat captopril verwijderd wordt door CAPD.

Overig	Opmerkingen
SPC Captopril Mylan oktober 2014	Bij Clcr < 10 ml/min/1,73 m ² dagelijkse aanvangsdosering 6,25 mg, dagelijkse maximumdosering 37,5 mg. Dagelijkse dosering aanpassen aan respons.

Opmerkingen:

-

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	9 mei 2017