

Dialyse hemodialyse: vigabatrine

6568

HD = hemodialyse

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
Bachmann D ea. Vigabatrin dosing during haemodialysis. Seizure 1996;5:239-42.	1	60% afname van serumspiegels vigabatrine door twee HD-sessies van elk 4 uur bij 59-jarige man met epilepsie (hypoxisch nierfalen en verminderde leverfunctie) die tijdens een epileptische aanval in de rivier was gevallen (bijna-verdrinking) en 3 dagen 500 mg vigabatrine kreeg en vervolgens 500 mg elke 3 dagen.	Auteurs: 500 mg elke drie dagen hield bij deze patiënt spiegels in therapeutisch gebied. Als toediening op dialysedag valt: dosis toedienen na dialyse.

Overig	Opmerkingen
SPC Sabril 17 mei 2014.	Het effect van hemodialyse bij de behandeling van een overdosis vigabatrine is onbekend. In enkele gevallen is gemeld dat hemodialyse de vigabatrineplasmaconcentraties met 40 tot 60% reduceerde bij patiënten lijdend aan nierfalen die behandeld werden met therapeutische doses vigabatrine.

Opmerkingen:

-

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Ja	Ja	24 januari 2017