

Dialyse peritoneaaldialyse: clodroninezuur

6575

CAPD = continue ambulante peritoneale dialyse

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
Saha HH ea. Pharmacokinetics of clodronate in peritoneal dialysis patients. Perit Dial Int 1998;18:204-9.	2	Slechts 7% van de clodroninezuurdosis verwijderd in 24 uur, $t_{1/2}$ tijdens CAPD 16,9 uur ($t_{1/2}$ bij normale nierfunctie $\pm$ 15 uur (SPC)) bij 10 patiënten die 1-malig 300 mg iv clodroninezuur kregen en CAPD ondergingen.	

Overig	Opmerkingen
SPC Bonafos 7 december 2015.	Bij $Cl_{cr} < 30$ ml/min: 800 mg/dag. Geen informatie over effect peritoneale dialyse. Er zijn geen farmacokinetische gegevens beschikbaar voor patiënten met nierinsufficiëntie met een creatinineklaring van minder dan 10 ml/min bij oraal gebruik van clodronaat. In deze gevallen kan het middel beter niet gebruikt worden, behalve bij kortdurend gebruik in aanwezigheid van een puur functionele nierinsufficiëntie veroorzaakt door verhoogde serumcalciumspiegels.

Opmerkingen:

-

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Nee	Ja	9 mei 2017