

Pitolisant + Rifampicine

M6032

Onderbouwend	Stof	Effect	Code
SPC + EPAR Wakix	pitolisant + rifampicine	afname AUC pitolisant 50% en Cmax 39%. Regime: rifampicine 600 mg/dag gedurende 7 dagen toegevoegd aan pitolisant, 18 gezonde vrijwilligers. Voorzichtig bij combinatie met krachtige CYP3A4-inductoren. Klinische monitoring is noodzakelijk bij combinatie en mogelijk ook dosisaanpassing nodig tijdens en één week na behandeling inductor.	2A

Overig	Stof	Effect
EPAR Wakix	pitolisant	a dose-range study conducted in patients with Parkinson's Disease and diurnal sleepiness showed that 20 mg OD was the minimum effective dose and its effect on Epworth Sleepiness Scale (ESS) was not different to the effect observed with the 40 mg OD dose. → GIC: maar deze studie is uitgevoerd bij Parkinsonpatiënten en pitolisant is geregistreerd voor narcolepsie. Geen gegevens hierover te vinden voor patiënten met narcolepsie. Dosering in SPC geeft aan start 9 mg, daarna omhoog of omlaag titreren tot 4.5 – 36 mg/dag. Dat suggereert een lagere minimale effectieve dosis en een grote individuele variatie.

Opmerkingen

Pubmed, Stockley: -

WFG: effect pitolisant kan afnemen, hiervoor moeten voorschrijver en patiënt worden gewaarschuwd.

Risicofactoren	
Mitigerende factoren	

	Interactie	Actie	Datum
Beslissing WFG	Ja	Ja	10 oktober 2017