

Dialyse peritoneaaldialyse: didanosine

6636

CAPD = continue ambulante peritoneale dialyse, PD = peritoneale dialyse

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
Knupp CA ea. Disposition of didanosine in HIV-seropositive patients with normal renal function or chronic renal failure: influence of hemodialysis and continuous ambulatory peritoneal dialysis. Clin Pharmacol Ther 1996;60:535-42.	1	$T_{1/2}$ 3,6 uur (tov $t_{1/2}$ 1,56 uur bij normale nierfunctie (n = 6)) bij 6 patiënten die CAPD ondergingen. Bij slechts één patiënt was dialysaatconcentratie hoog genoeg om PD-klaring (2,2 ml/min) uit te kunnen rekenen.	Auteurs: CAPD heeft minimaal effect op de klaring van didanosine.
SPC Videx, 20 april 2016.	0	Na orale dosis was didanosine niet detecteerbaar in de PD-vloeistof.	Didanosine is niet dialyseerbaar door PD.

Overig	Opmerkingen
Richtlijn Nederlandse Vereniging voor HIV Behandelaren, http://richtlijn hiv.nvhb.nl/index.php/9.6._Dosering_en_bij_gestoorde_lever_en_nierfunctie , geraadpleegd juni 2017	100 mg 1 x per dag.

Opmerkingen:

-

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Nee	Ja	24 oktober 2017