

Dialyse hemodialyse: emtricitabine

6637

ESRD = end-stage renal disease, HD = hemodialyse.

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
SPC Emtriva, 22 september 2008.	0	Bij patiënten met ESRD werd ca. 30% van de dosis emtricitabine teruggevonden in het dialysaat tijdens een 3 uur durende dialyseperiode die binnen 1,5 uur na toediening van de dosis emtricitabine was gestart (bloedstroomsnelheid 400 ml/min en dialysaatstroomsnelheid van ca. 600 ml/min).	Clcr < 15 ml/min (functioneel nierloos met noodzaak van periodieke hemodialyse): één harde capsule (200 mg) om de 96 uur (hierbij is uitgegaan van 3 HD-sessies per week, elk met een duur van 3 uur en beginnend tenminste 12 uur na toediening van de laatste dosis emtricitabine. Volgens fabrikant is de studie nooit gepubliceerd.

Overig	Opmerkingen
- Richtlijn Nederlandse Vereniging voor HIV Behandelaren, http://richtlijnhiiv.nvvhb.nl/index.php/9.6._Doserings_bij_gestoorde_lever_en_nierfunctie , geraadpleegd juni 2017.	advies: Clcr < 10 ml/min: 1 x 200 mg/ 4 dagen; doseer altijd NA dialyseren. Hierbij is uit gegaan van normaal lichaamsgewicht en afwezigheid van interacties. Gebruik spiegelbepaling om te voorkomen dat sterk afwijkende spiegels optreden.

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Ja	Ja	24 oktober 2017