

Dialyse peritoneaaldialyse: tenofoviridisoproxil

6640

PD = peritoneale dialyse

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
Aleman J ea. Tenofovir disoproxil treatment for a HIV-hepatitis B virus coinfecting patient undergoing peritoneal dialysis: which dose do we need? AIDS 2015;29:1579-80.	1	46-jarige man met HIV en hepatitis B-infectie kreeg 245 mg tenofovir disoproxil fumarate (DF) per week. Dalspiegel in serum was 0,52 mg/l (boven therapeutische range van 0,05-0,30 mg/l) en 0,20 mg/l in 24-uurs dialysevloeistof. Slechts 3,07 mg tenofovir DF per 24 uur verwijderd door PD. Dosering aangepast naar 245 mg per 2 weken, dalspiegel daardoor naar 0,20 mg/l (binnen therapeutische range).	Auteurs: bij patiënten op PD dosering 245 mg per 2 weken.

Overig	Opmerkingen
SPC Viread 17 mei 2017.	Geen informatie over PD.

Opmerkingen:

-

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	24 oktober 2017