

Dialyse peritoneaaldialyse: fluorouracil

6656

CAPD = continue ambulante peritoneale dialyse, HD = hemodialyse

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
Eads JR ea. A pharmacokinetic analysis of cisplatin and 5-fluorouracil in a patient with esophageal cancer on peritoneal dialysis. Cancer Chemother Pharmacol 2016;77:333-8.	0	PD verwijderde 0,0049 mg (0,072%) van de dosis van 5-FU bij 72-jarige vrouw met stadium IIB oesofagaal adenocarcinoom die al 2,5 jaar CAPD onderging. Regime: 25 mg/m ² cisplatine (dosis aangepast naar nierfunctie) op dag 1 van week 1,5,8 en 11, gevolgd door 1000 mg/m ² 5-FU via continue infusie eerste 96 uur van week 1,5,8 en 11 (ook radiotherapie gegeven). CAPD werd tijdens de kuur voortgezet (4 wisselingen per dag, elke 6 uur).	

Overig	Opmerkingen
SPC 5-Fluorouracil Sandoz februari 2017.	Geen informatie over PD.

Opmerkingen:

-

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Nee	Nee	Nee	24 oktober 2017