

Dialyse hemodialyse: vinflunine

6671

HD = hemodialyse

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC Javlor 21 september 2009.	Geen informatie over Clcr < 20 ml/min en HD.
Isambert N ea. How to manage intravenous vinflunine in cancer patients with renal impairment: results of a pharmacokinetic and tolerability phase I study. Br J Clin Pharmacol 2014;77:498-508.	Auteurs hebben alleen patiënten bestudeerd met Clcr 20-40 ml/min en 40-60 ml/min (n = 33 (totaal)). Patiënten met ESRD en/of dialyse waren niet geïnccludeerd. Desondanks doen auteurs op grond van extrapolatie van hun gegevens een dosisaanbeveling: 50% van de normale dosering bij ESRD. Auteurs: data over dialyse ontbreken, maar hoge verdelingsvolume, lange halfwaardetijd en de overwegend non-renale klaring maken het onwaarschijnlijk dat vinflunine wordt geklaard door intermitterende hemodialyse. Vinflunine zou kunnen worden toegediend na dialyse of op een dialysevrije dag.

Opmerkingen:

-

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	24 oktober 2017