

Dialyse peritoneaaldialyse: amantadine

6688

PD = peritoneale dialyse

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen

Overig	Opmerkingen
SPC Symmetrel 11 juli 2016.	Clcr < 15 ml/min/1,73 m² : 100 mg 1x per 7 dagen. -Bij profylaxe en behandeling van infecties met influenza A: oplaaddosis 200 mg, vervolgens doseringsinterval van 7 dagen. -Bij diagnostisering parkinsonisme bij al aanwezige nierfunctiestoornis (met of zonder hemodialyse): oplaaddosis van 100 mg op dag 1 van behandeling vervolgens doseringsinterval van 7 dagen aanhouden. Geen informatie over PD.
Ing TS ea. Removal of amantadine hydrochloride by dialysis in patients with renal insufficiency. Can Med Assoc J 1976;115(6):515.	Door PD plasmaspiegel van 2,5 naar 1,9 µg/ml (24% daling) en van 1,50 naar 0,90 (40% daling) µg/ml bij resp. twee patiënten van 69 en 76 jaar die amantadine 100-200 mg per dag kregen. PD-sessies duurden 50-56 uur (► GIC: plasmaspiegels hoger dan normaal (0,68-1,01 µg/ml, zie ook HD).

Opmerkingen:

-

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	28 november 2017