

Dialyse peritoneaaldialyse: valproïnezuur

6567

PD = peritoneale dialyse

Onderbouwend	Bewijs	Effect	Opmerkingen
-			

Overig	Opmerkingen
SPC Depakine chrono 19 mei 2016.	Bij patiënten met nierfunctiestoornissen is dosisaanpassing aan de hand van klinische controle nodig. Geen informatie over PD.
Kumar A ea. Severe valproate induced hyperammonemic encephalopathy successfully managed with peritoneal dialysis. Indian J Crit Care Med 2014;18:461-3.	35-jarige vrouw met valproaatgeïnduceerde hyperammonemie (VIH, onder meer neurologische klachten) werd succesvol behandeld met peritoneale dialyse. Patiënt gebruikte al 6 maanden valproïnezuur voorafgaand aan een operatie (resectie hersenvliestumor), maar 2 dagen na operatie ontwikkelde ze VIH. PD werd 48 uur later gestart en na 10 cycli trad verbetering van neurologische complicaties op. Na 30 PD-cycli kon ze van de beademing af en kon inotrope behandeling worden gestaakt.

Opmerkingen:

	Wijziging kinetiek	Effect dialyse	Actie	Datum
Beslissing werkgroep	Ja	Onbekend	Ja	28 november 2017