



Diabetes Mellitus: bewust niet uitgewerkt (nee/nee)

6788

In dit document staan nog niet uitgewerkte contra-indicatiebewakingen waarvoor de gevonden informatie wijst op een nee/nee-bewaking. Voor deze contra-indicatiebewakingen is informatie gezocht n.a.v. aanmelding van nieuwe geneesmiddelenproducten voor de G-Standaard, meldingen vanuit de praktijk, informatie uit nieuwe literatuur of uit bijgewerkte SmPC's. Of er is informatie gezocht bij het updaten van een oudere contra-indicatie.

Deze contra-indicatiebewakingen werken we NIET uit. Ze zullen dan ook niet worden opgenomen in de G-Standaard en Health Base Medicatiebewaking.

Geneesmiddel(groep)	Toelichting	Datum uitgewerkt	Datum akkoord werkgroep
Cytisinicline	Aanleiding SmPC Cytisinicline 4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik U moet extra voorzichtig zijn met Decigatan als u lijdt aan ischemische hartziekten, hartfalen, hypertensie, pheochromocytoma, atherosclerose en andere perifere vaatziekten, maag- en darmzweren, gastro-oesofageale refluxziekte, hyperthyreoïdie, diabetes of schizofrenie Pubmed search: ((diabetes mellitus) OR (hyperglycemia) OR (hypoglycemia)) AND ((Cytisine) OR (cytisinicline))) 5 hits waarvan 1 relevant Jin L, Tu J, Jia J, An W, Tan H, Cui Q, Li Z. Drug-repurposing identified the combination of Trolox C and Cytisine for the treatment of type 2 diabetes. J Transl Med. 2014 May 31;12:153. In deze preklinische studie wordt beschreven dat cytisine in combinatie met Trolox C kan worden gebruikt bij de behandeling van diabetes mellitus type II. Conclusie:	15-07-2022	20-10-2022

	Ondanks dat in de SmPC van cytosine diabetes mellitus als waarschuwing wordt genoemd, kan dit niet worden onderbouwd met de beschikbare literatuur.		
Binimetinib	SPC Mektovi, 12-10-2018: Waarschuwing: Binimetinib wordt niet aanbevolen bij patiënten met een voorgeschiedenis van RVO (retinale veneuze occlusie). De veiligheid van binimetinib werd niet vastgesteld bij patiënten met bevorderende factoren voor RVO waaronder ongecontroleerde diabetes mellitus. Daarom dient binimetinib met voorzichtigheid te worden gebruikt bij deze patiënten. Conclusie: niet uitwerken. Ongecontroleerde diabetes mellitus wordt genoemd als risicofactor voor RVO. Bij contra-indicaties wordt niet bewaakt op de aandoening als risicofactor.	12-10-2018	14-11-2019
Linacotide	SPC 11-06-2014: Waarschuwing: Bij langdurige (d.w.z. langer dan 1 week) of ernstige diarree moet medisch advies worden ingewonnen en moet tijdelijke stopzetting van linacotide worden overwogen tot de diarree verdwenen is. Extra voorzichtigheid is geboden bij patiënten die vatbaar zijn voor een verstoring van de water- of elektrolytenhuishouding (bijv. ouderen, patiënten met hart- en vaatandoeningen, diabetes, hoge bloeddruk) en een elektrolytencontrole moet worden overwogen. Conclusie: Hoort bij gebruikelijke handelwijze bij optreden van diarree. Geen reden voor CI.	13-08-2015	19-11-2015