



Glaucoom: bewust niet uitgewerkt

6812

In dit document staan nog niet uitgewerkte contra-indicatiebewakingen waarvoor de gevonden informatie wijst op een nee/nee-bewaking. Voor deze contra-indicatiebewakingen is informatie gezocht n.a.v. aanmelding van nieuwe geneesmiddelenproducten voor de G-Standaard, meldingen vanuit de praktijk, informatie uit nieuwe literatuur of uit bijgewerkte SmPC's. Of er is informatie gezocht bij het updaten van een oudere contra-indicatie. Deze contra-indicatiebewakingen werken we NIET uit. Ze zullen dan ook niet worden opgenomen in de G-Standaard en Health Base Medicatiebewaking.

Geneesmiddel(groep)	Toelichting	Datum uitgewerkt	Datum akkoord werkgroep
(fos)levodopa	Aanleiding: SmPC Duodopa (foslevodopa+foscarnidopa) 4.3 Contra-indicaties: nauwe-kamerhoekglaucoom 4.4 Waarschuwingen: Duodopa oplossing voor infusie mag voorzichtig toegediend worden aan patiënten met eenvoudig chronisch glaucoom (open-kamerhoekglaucoom) indien de intraoculaire druk goed onder controle is en regelmatig zorgvuldig gecontroleerd wordt tijdens de behandeling. Er worden geen adviezen gegeven voor nauwe-kamerhoekglaucoom. Zoektermen: PUBMED (03-01-2023): (duodopa OR foslevodopa OR foscarnidopa OR levodopa OR carbidopa) AND (Narrow-angle glaucoma) Geen resultaten. EMBASE (03-01-2023): ('carbidopa plus levodopa'/exp OR 'levodopa'/exp OR 'carbidopa'/exp OR 'foscarnidopa plus foslevodopa'/exp OR 'foslevodopa'/exp OR 'foscarnidopa'/exp) AND 'narrow-angle glaucoma'/exp Geeft irrelevante resultaten. Conclusie: bewust niet uitwerken (N/N); geen relevante literatuur gevonden.	12-01-2023	04-04-2023

Opium	In de SPC van Dropizol (opium tinctuur) staat glaucoom vermeld als contra-indicatie. Hierbij is geen verklarend mechanisme vermeld. Pubmed + Embase 12-03-2020: Geen relevante literatuur gevonden.	12-03-2020	26-10-2020
Binimetinib	SPC Mektovi, 12-10-2018: Waarschuwing: Binimetinib wordt niet aanbevolen bij patiënten met een voorgeschiedenis van RVO (retinale veneuze occlusie). De veiligheid van binimetinib werd niet vastgesteld bij patiënten met bevorderende factoren voor RVO waaronder ongecontroleerd glaucoom. Daarom dient binimetinib met voorzichtigheid te worden gebruikt bij deze patiënten. Conclusie: bewust niet uitwerken. Glaucoom wordt genoemd als risicofactor voor RVO. Bij contra-indicaties bewaken we niet op de aandoening als risicofactor.	12-10-2018	14-11-2019